
FLORA DEL VALLE DE TEHUACÁN-CUICATLÁN

LEMNACEAE







INSTITUTO DE BIOLOGÍA

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

Instituto de Biología

Director

Victor Manuel G. Sánchez-Cordero Dávila

Secretario Académico Atilano Contreras Ramos

Secretaria Técnica Noemí Chávez Castañeda

EDITORA

Rosalinda Medina Lemos

Departamento de Botánica, Instituto de Biología Universidad Nacional Autónoma de México

COMITÉ EDITORIAL

Abisaí J. García Mendoza

Jardín Botánico, Instituto de Biología Universidad Nacional Autónoma de México

Salvador Arias Montes

Jardín Botánico, Instituto de Biología Universidad Nacional Autónoma de México


Rosaura Grether González

División de Ciencias Biológicas y de la Salud Departamento de Biología Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa

Rosa María Fonseca Juárez

Laboratorio de Plantas Vasculares Facultad de Ciencias Universidad Nacional Autónoma de México

Nueva Serie Publicación Digital, es un esfuerzo del **Departamento de Botánica del Instituto de Biología, Universidad Nacional Autónoma de México**, por continuar aportando conocimiento sobre nuestra Biodiversidad, cualquier asunto relacionado con la publicación dirigirse a la Editora: Apartado Postal 70-233, C.P. 04510. Ciudad de México, México o al correo electrónico: mlemos7@gmail.com



Autor: Elvia Esparza. Año: 2004. Título: Diversidad de Lemnaceae (Lentejillas). Técnica: Acuarela, pincel seco. Género: Ilustración científica desarrollada para el proyecto: Iconografía y estudio de plantas acuáticas de la Ciudad de México y sus alrededores. Medidas: 40.0 cm largo x 32.0 cm ancho. Colección: obra del Archivo Histórico de la Biblioteca del Instituto de Biología, Universidad Nacional Autónoma de México. Descripción: plantas acuáticas, libres flotadoras o sumergidas, dulceacuícolas de lagos, lagunas costeras, ciénagas, charcos, zonas inundables, canales de riego, manantiales y arroyos de poca corriente, se representa aquí la variación de formas de vida de ésta familia.

FLORA DEL VALLE DE TEHUACÁN-CUICATLÁN

LEMNACEAE Martinov **Paulina Izazola-Rodríguez***

*Departamento de Botánica, Instituto de Biología Universidad Nacional Autónoma de México





INSTITUTO DE BIOLOGÍA

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

NUEVA SERIE PUBLICACIÓN DIGITAL Libellorum digitalium series nova

FLORA DEL VALLE DE TEHUACÁN-CUICATLÁN

Primera edición: 2018

D.R. © Universidad Nacional Autónoma de México Instituto de Biología. Departamento de Botánica

Ciudad de México, México

ISBN 978-607-30-0900-3 Flora del Valle de Tehuacán-Cuicatlán

ISBN 978-607-30-0903-4 LEMNACEAE

DOI

Coordinadora y Editora: Rosalinda Medina Lemos Formación en computadora: Alfredo Quiroz Arana

Dirección de la autora:

Instituto de Biología, Departamento de Botánica Universidad Nacional Autónoma de México 3er. Circuito de Ciudad Universitaria Coyoacán, 04510. Ciudad de México, México.



En la portada:

- 1. Mitrocereus fulviceps (cardón)
- 2. Beaucarnea purpusii (soyate)
- 3. Agave peacockii (maguey fibroso)
- 4. *Agave stricta* (gallinita) Dibujo de Elvia Esparza

LEMNACEAE¹ Martinov Paulina Izazola-Rodríguez

Bibliografía. Ancona, L. 1930. Las lemnáceas y las larvas de mosquitos. Sección de botánica, sistemática y ecología. Anales Inst. Biol. Univ. Nac. Autón. México, Biol. 1: 33-37. APG III. 2009. An update of the Angiosperm Phylogeny Group classification for the orders and families of flowering plants. J. Linn. Soc., Bot. 161(2): 105-121. APG IV. 2016. An update of the Angiosperm Phylogeny Group classification for the orders and families of flowering plants. J. Linn. Soc., Bot. 181(1): 1-20. Bravo, H. 1930. Contribución al estudio de la flora mexicana: Las lemnáceas del Valle de México. Sección de botánica, sistemática v ecología. Anales Inst. Biol. Univ. Nac. Autón. México, Biol. 1: 7-32. Cabrera, L., G. Salazar, M.W. Chase, S. Mayo, J. Bogner & P. Dávila. 2008. Phylogenetic relationships of aroids and duckweeds (Araceae) inferred from coding and noncoding plastid DNA. Amer. J. Bot. 95(9): 1153-1165. Cook, C.D.K. 1996. Aquatic plant book. 2a. ed. Amsterdam: SPB Academic Publishing p. 113. Cronquist, A. 1981. An integrated system of classification of flowering plants. New York: Columbia University Press 1093-1100 pp. Cross, J.W. 2015. The Charms of Duckweed: An introduction to the smallest flowering plants. http:// www.mobot.org/jwcross/duckweed/duckweed.htm Consultada el 27 de julio de 2018. Cusimano, N., J. Bogner, S.J. Mayo, P.C. Boyce, S.Y. Wong., M. Hesse, W.L. Hetterscheid, R.C. Keating & J.C. French. 2011. Relationships within the Araceae: Comparison of morphological patterns with molecular phylogenies. Amer. J. Bot. 98(4): 654-668. Davenport, L.J. & R.R. Haynes. 2001. Lemnaceae. In: W.D. Stevens, C. Ulloa Ulloa, A. Pool & O.M. Montiel. Fl. de Nicaragua. Monogr. Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. 85(2): 1211-1213. Heng, L. & E. Landolt. 2010. Lemnaceae. Fl. of China, 23: 80-83. http://flora.huh.harvard.edu/china/mss/volume23/Flora_of_China_Vol_23_Lemnaceae.pdf Consultada el 27 de julio de 2018. Judd, W.S., C.S. Campbell, E.A. Kellogg, P.F. Stevens & M.J. Donoghue. 2002. Plant systematics: a phylogenetic approach. 2a. ed. Massachusetts: Sinauer Associates, Inc. p. 244. Landolt, E. 1986. The family of Lemnaceae a monographic study. Zurich: Veroff. Geobot. Inst. ETH, Stift. Rubel Zuer. 1: 71-566. Landolt, E. 1992. Lemnaceae Duckweed Family. J. Arizona-Nevada Acad. Sci. 26: 10-14. Landolt, E. & U. Schmidt-Mumm. 2009. Lemnaceae. In: J. Betancourt, G. Galeano & J. Aguirre-C. (eds.). Fl. de Colombia. Instituto de Ciencias Naturales, Universidad Nacional de Colombia. Bogotá, Colombia 24: 1-54. Les, D.H., D.J. Crawford, E. Landolt, J.D. Gabel & R.T. Kimball. 2002. Phylogeny and systematics of Lemnaceae, the duckweed family. Syst. Bot. 27(2): 221-240. Lot, A. & A. Novelo. 2004. Iconografía y estudio de plantas acuáticas de la Ciudad de México y sus alrededores. Instituto de Biología, Universidad Nacional Autónoma de México. México 206 p. Lot, A., A. Novelo, M. Olvera & P. Ramírez. 1999. Catálogo de angiospermas acuáticas de México: hidrófitas estrictas, emergentes, sumergidas y flotantes. Instituto de Biología, Universidad Nacional Autónoma de México. México. Cuadernos 33.

¹ Agradecemos al Dr. Antonio Lot, su tiempo y disposición en la revisión de este trabajo.

LEMNACEAE P. IZAZOLA-RODRÍGUEZ

161 p. McVaugh, R. & S.D. Koch. 1983. Lemnaceae. In: W. Anderson (ed.). Flora Novo-Galiciana: a descriptive account of the vascular plants of western Mexico. University of Michigan Press 13: 109-120. Novelo, A. & A. Lot. 2001. Lemnaceae. In: G. Calderón de Rzedowski & J. Rzedowski. (eds.). Fl. Fanerogámica del Valle de México. 2a. ed. Instituto de Ecología, A.C. Pátzcuaro, Michoacán, México y Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, México. 1170-1176 pp. Olvera, M. & A. Lot. 2013. Lemnaceae. In: A. Lot, R. Medina-Lemos & F. Chiang (eds.). Plantas acuáticas mexicanas: una contribución a la Flora de México. Instituto de Biología, Universidad Nacional Autónoma de México. México 1: 213-222. Stevens, P.F. 2001. Angiosperm Phylogeny Website. Version 14, July 2017. http://www.mobot.org/MOBOT/research/APweb/. Consultada el 24 de junio de 2018. Takhtajan, A. 2009. Flowering plants. 2a. ed. Springer Science + Busines Media B.V. p. 619. The Plant List. 2013. Version 1.1. Published on the Internet; http://www.theplantlist.org/ (accessed 1st January). Consultada el 24 de junio de 2018. Zetina-Córdoba, P., J.L. Reta-Mendiola, M.E. Ortega-Cerrilla, E. Ortega-Jiménez, M.T.E. Sánchez-Torres, J.G. Herrera-Haro & M. Becerril-Herrera. 2010. Utilización de la lenteja agua (Lemnaceae) en la producción de tilapia (*Oreochromis* spp.). Arch. Zootec. 59: 133-155. Zomlefer, W.B. 1994. Guide to flowering plant families. The University of North Carolina: Chapel Hill 303-305 pp.

Hierbas perennes, acuáticas, libres flotadoras sobre o debajo de la superficie del agua, dulceacuícolas, monoicas. Raíces simples, 1-numerosas o ausentes. Frondas solitarias o coloniales; unidas por estípites, láminas orbiculares a lineares, ápice redondeado o ligeramente agudo en los extremos, margen entero, carnosas o membranáceas, planas o gibosas, verde brillante, con frecuencia rojizas en una o ambas superficies, glabras, nervaduras 1-numerosas o ausentes, generalmente con papilas en la nervadura central. Inflorescencias reducidas a 1 o 2 flores, en sacos laterales reproductores o en una cavidad dorsal, con 1 espata o ésta ausente. Flores actinomorfas, unisexuales, hipóginas, extremadamente reducidas; perianto ausente; las masculinas 2 generalmente, androceo con 1-2 estambres, filamentos filiformes o fusiformes o ausentes, antera 1-2, 1-teca, dehiscencia longitudinal o transversal; las femeninas sólo 1, gineceo con ovario súpero, 1-carpelar, 1-locular, 1-7 óvulos, ortótropos, placentación basal, estilo 1, corto, estigma 1, infundibuliforme. Frutos en utrículos; semillas 1-4, ovoides, lisas o longitudinalmente costilladas, endospermo escaso, carnoso o ausente, embrión formado por un cotiledon relativamente largo, recto.

Discusión. APG III (2009), a través de análisis moleculares basados en ADN de cloroplasto, ubica a Lemnaceae Martinov como subfamilia Lemnoideae, en la familia Araceae Juss. y el orden Alismatales, cambio que se mantiene a la fecha en APG IV (2016).

En esta flora se sigue el criterio de Cronquist (1981) es decir, se le trata como familia Lemnaceae, por razones convenientes al hacer la revisión de los grupos de plantas acuáticas estrictas en la región.

Cronquist (1981) ubica a Lemnaceae en el orden Arales junto con la familia Araceae, mencionando que Lemnaceae se relaciona directamente con Ara-

ceae a través del género *Pistia* L., una acuática libre flotadora con una espata relativamente pequeña y con pocas flores, la cual podría marcar el camino hacia *Spirodela* Schleid., el género menos reducido de la familia Lemnaceae. Sin embargo, esta relación sólo se basó en similitud morfológica y a través de análisis filogenéticos, no se observa ninguna relación entre ambos géneros.

Takhtajan (2009) reconoce 2 subfamilias en Lemnaceae: Lemnoideae y Wolffioideae, siendo la presencia o ausencia de raíces, respectivamente, lo que las distingue. Les *et al.* (2002), coinciden en que la familia Lemnaceae Martinov está dividida en dos subfamilias, Lemnoideae y Wolffioideae.

La subfamilia Lemnoideae, está conformada por: el género *Lemna* L., que se divide en 4 secciones, cada una con características morfológicas bien definidas: *Lemna* (8 spp.), *Alatae* (2 spp.), *Biformes* (1 sp.) y *Uninerves* (3 spp.) y los géneros *Landoltia* Les & D.J. Crawford (1 sp.) y *Spirodela* Schleid. (2spp.).

Por otro lado, la subfamilia Wolffioideae comprende 2 géneros: *Wolffia* Horkel ex Schleid. con 4 secciones: *Wolffia* (7 spp.), *Australiana* (1 sp.), *Pigmentatae* (2 spp.) y *Pseudorrhizae* (1 sp.); *Wolffiella* Hegeml. con 3 secciones: *Wolffiella* (7 spp.), *Rotundae* (1 spp.) y *Stipitatae* (2 spp.).

La subfamilia Wolffioideae representa un clado monofilético, mientras que la subfamilia Lemnoideae resulta parafilética. Se ha sugerido que para resolver esta situación, los géneros *Landoltia* y *Spirodela*, se jerarquicen a nivel de subfamilia; este arreglo es resultado de diversos análisis filogenéticos, utilizando datos morfológicos, anatómicos, alozimas, así como secuencias de ADN (genes de cloroplasto e intrones) (Les *et al.* 2002).

Por décadas ha sido difícil establecer las relaciones de la familia Lemnaceae con otros grupos, por su tamaño diminuto y la gran reducción de los órganos. Cabrera *et al.* (2008), basados en análisis moleculares y apoyado en estudios palinológicos encontró que Lemnaceae es el grupo hermano de las Araceae Juss., menciona que si Lemnaceae se reconoce como independiente, entonces Araceae resulta parafilética.

Les *et al.* (2002), a través de análisis morfológicos y moleculares, concuerdan con la inclusión de Lemnaceae en Araceae, sin embargo, mencionan que aún no se sabe cuál es el taxa más relacionado filogenéticamente a este clado. El registro fósil también ha sido importante, aunque es escaso, se asigna al género fósil *Limnobiophyllum* como el eslabón entre las familias Lemnaceae y Araceae.

Stevens (2001) divide la familia Araceae, en 8 subfamilias, una de ellas Lemnoideae con 5 géneros y 37 especies.

Lemnaceae tiene un papel ecológico muy importante a pesar del pequeño tamaño. Por un lado, presentan un rápido crecimiento que, sin el debido control, puede volverse una plaga, afectando el mantenimiento de poblaciones de organismos acuáticos al disminuir el intercambio gaseoso e impedir el suministro de oxígeno al ecosistema. Sin embargo, con un manejo adecuado, pueden ser aprovechables para diferentes actividades. Destacan la producción de alimento con altos contenidos proteicos para animales como ganado, aves, peces, entre otros.

Su papel en el tratamiento de aguas negras o cuerpos de agua contaminados es relevante, ya que estas plantas tienen la capacidad de absorción y retención de metales pesados, así como la remoción de nitrógeno, fósforo, potasio, calcio, sodio y magnesio (Zetina-Córdoba, 2010).

Son fuente importante de alimento para peces y se usan como ornamentales en lagos o acuarios. La dispersión es por agua o a través de animales. Puede ocurrir polinización cruzada a través de insectos que entran directamente en contacto con las flores (Landolt, 1986).

También es relevante el papel que juegan en la regulación de ecosistemas acuáticos al proporcionar condiciones favorables de hábitat para otros organismos y se ha encontrado que impiden el desarrollo de las larvas de mosquitos (Ancona, 1930).

Diversidad. Familia con 5 géneros y 38 especies en el mundo, 4 géneros y 15 especies en México, 1 género y 1 especie en el Valle de Tehuacán-Cuicatlán. Distribución. Cosmopolita, excepto regiones ártica, antártica y desérticas. Nombre vulgar. "Lentejas de agua".

1. LEMNA L., Sp. Pl. 2: 970. 1753.

Lemna Raf., Amer. Monthly Mag. & Crit. Rev. 2: 43. 1817. illeg. hom. post.

Bibliografía. Azer, S.A. 2013. Taxonomic revision of genus *Lemna* L. (Lemnaceae Gray) in Egypt. *Ann. Agric. Sci.* 58(2): 257-263. Reveal, J.L. 1990. The neotypification of *Lemna minuta* Humb., Bonpl. & Kunth, an earlier name for *Lemna minuscula* Herter (Lemnaceae). *Taxon* 38(2): 329. Venu, P. 2012. The taxonomy and report of flowering in *Lemna* L. (Lemnaceae) in India. *Curr. Sci.* 102(12): 1629-1632.

Hierbas libres flotadoras, sobre o debajo de la superficie del agua, hasta 5.0 mm alto. Raíz 1 por fronda, vaina tubular o a veces alada en la base. Frondas solitarias o en colonias, planas o gibosas, lanceoladas, elípticas a obovadas, margen entero o denticulado, membranáceas, verdes, escama dorsal y ventral ausente, 1-5 nervaduras. Flores en sacos laterales, 2 flores masculinas, 1 flor femenina, rodeadas por una espata; masculinas con 2 estambres, filamentos delgados, anteras globosas, 2-loculares; femeninas con ovario 1-locular, 1-7 óvulos. Frutos ovoides, con o sin alas; semillas 1-numerosas, ovoides, costilladas longitudinalmente.

Discusión. El género *Lemna*, comparado con los otros géneros de la subfamilia, es el de mayor tamaño. A pesar que muchos autores han considerado a *Lemna* y *Spirodela* Schleid. en uno solo, Landolt (1986) menciona que estos géneros pueden distinguirse por caracteres morfológicos y bioquímicos; en el primero, se presenta una raíz por fronda, con 1-5 nervaduras, mientras que el segundo presenta de 2-21 raíces por fronda y 5-16 nervaduras.

No debe confundirse con los géneros *Wolffia* Horkel ex Schleid. y *Wolffiella* Hegelm., ya que éstos no presentan raíces ni nervaduras.

A pesar de que los datos morfológicos representan un grupo parafilético del género, análisis de datos moleculares combinados con no moleculares, colocan al género en un clado monofilético (Les *et al.* 2002).

The Plant List (2013) registra 71 nombres para especies de *Lemna*, de los cuales sólo reconoce a 14 como válidos.





Fig. 1. Lemna minuta. -a. Frondas vistas por la parte superior. -b. Fronda en vista lateral, mostrando la raíz. -c. Fronda vista por la parte inferior mostrando la inflorescencia, en el interior detalle de fruto inmaduro. -a. y -b. Ilustrado por **Elvia Esparza**, reproducido de Iconografía y estudio de plantas acuáticas de la Ciudad de México y sus alrededores p. 32. 2004, con autorización del editor; -c. ilustrado por **Albino Luna**.



Diversidad. Género con 13 especies en el mundo, 7 en México, 1 en el Valle de Tehuacán-Cuicatlán.

Distribución. Cosmopolita, excepto regiones árticas y antárticas.

Lemna minuta Kunth, Nov. Gen. Sp. (4a. ed.) 1: 372. 1815[1816]. Lemna minima Thuill. ex P.Beauv., J. Phys. Chim. Hist. Nat. Arts 82. 1816. Lemna minima Chev., Fl. Gén. Env. Paris 2: 256. 1827. Lemna minima Humb. & Kunth ex Kunth, Enum. Pl. 3: 5. 1841, nom. inval. Lemna minima Phil., Linnaea 33: 239. 1864, nom. inval. Lemna minima Phil. ex Hegelm. Bot. Jahrb. Syst. 21: 298. 1895, nom. illeg. hom. Lemna abbreviata Hglm., Bot. Jahrb. Syst. 21: 298. 1895. Lemna minuscula Herter, Rev. Sudam. Bot. 9: 185. 1954, nom. illeg. superfl. TIPO: CHILE. Santiago, R.A. Philippi 730, may 1857 (neotipo: S SR9222! designado por Reveal, 1990).

Hierbas libres flotadoras sobre la superficie del agua. Frondas solitarias o colonias pequeñas de 2-4 frondas, 1.2-2.3 mm largo, 0.6-1.4 mm ancho, elípticas a oblongas, base simétrica, sin alas, 1 nervadura central marcada por una hilera de papilas esponjosas en el envés, verde-amarillentas, rara vez florecen y fructifican. Flores rodeadas por una espata; masculinas no vistas; femeninas con un óvulo, estilo corto, ápice papilado. Frutos oblongos, ligeramente comprimidos; semilla 1, costillada.

Discusión. Es una de las especies de menor tamaño, con las frondas más pequeñas. Frecuentemente es confundida con las especies *L. valdiviana* Phil. y *L. obscura* (Austin) Daubs, sin embargo, *L. minuta* Kunth se diferencia por la base simétrica de las frondas y la hilera de papilas en la nervadura central del envés.

Distribución. Estados Unidos a Sudamérica, incluyendo Antillas. Introducida en Europa y Asia. En México se tienen registros de la Ciudad de México y los estados de Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Coahuila, México, Michoacán, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, San Luis Potosí y Sonora.

Ejemplar examinado. OAXACA. Dto. Teposcolula: camino de Teposcolula a San Vicente Nuñu, Arroyo Palenque, *Lorence et al. 3398* (MEXU).


Hábitat. Ambiente dulceacuícola tranquilo de ligero movimiento, en un arroyo. En elevaciones ca. 2200 m.

Nombres vulgares. "Chilicastle", "lentejilla".

Fenología. Floración y fructificación a lo largo del año, aunque mayormente se multiplican vegetativamente.

ÍNDICE DE NOMBRES CIENTÍFICOS

```
Alismatales 2
Araceae 1, 2, 3
Arales 2
Landoltia 3
Lemna 3, 4, 6
        L. abbreviata 7
        L. minima 7
        L. minuscula 4, 7
        L. minuta 4, 5, 6, 7
        L. obscura 7
        L. valdiviana 7
Lemnaceae 1, 2, 3, 4
Lemnoideae 2, 3
        sect. Alatae 3
        sect. Biformis 3
        sect. Lemna 3
        sect. Uninerves 3
Limnobiophyllum 3
Pistia 3
Spirodela 3, 4
Wolffia 3, 4
        sect. Australiana 3
        sect. Pigmentatae 3
        sect. Pseudorrhizae 3
        sect. Wolffia 3
Wolffiella 3, 4
        sect. Rotundae 3
        sect. Stipitatae 3
        sect. Wolffiella 3
Wolffioideae 3
```



LEMNACEAE P. IZAZOLA-RODRÍGUEZ

OAXACA

DISTRITO	MUNICIPIO	No.
I Coixtlahuaca	Concepción Buenavista	1
	San Cristóbal Suchixtlahuaca	2
	San Francisco Teopan	3
	San Juan Bautista Coixtlahuaca	4
	San Mateo Tlapiltepec	5
	San Miguel Tequixtepec	6
	San Miguel Tulancingo	7
	Santa Magdalena Jicotlán Santa María Nativitas	8 9
	Santia Maria Nativitas Santiago Ihuitlán Plumas	10
	Santiago Inditian Flamas Santiago Tepetlapa	11
	Tepelmeme Villa de Morelos	12
	Tlacotepec Plumas	13
II Cuicatlán	Congención Dánolo	14
II Culcatian	Concepción Pápalo San Juan Bautista Cuicatlán	15
	San Juan Tepeuxila	16
	San Pedro Jaltepetongo	17
	San Pedro Jocotipac	18
	Santa María Texcatitlán	19
	Santiago Nacaltepec	20
	Santos Reyes Pápalo	21
	Valerio Trujano	22
III Etla	San Francisco Telixtlahuaca	23
	San Jerónimo Sosola	24
	San Juan Bautista Atatlahuaca	25
	Santiago Tenango	26
IV Huajuapan	Asunción Cuyotepeji	27
- · · - · · · · · · · · · · · · · · · ·	Cosoltepec	28
	Ciudad de Huajuapan de Léon	29
	San Andrés Dinicuiti	30
	San Juan Bautista Suchitepec	31
	San Pedro y San Pablo Tequixtepec	32
	Santa Catarina Zapoquila	33
	Santa María Camotlán	34
	Santiago Chazumba	35
	Santiago Huajolotitlán	36
	Santiago Miltepec	37
	Zapotitlán Palmas	38

FLORA DEL VALLE DE TE	HUACÁN-CUIO	CATLÁN	1-8. 2018
DISTRITO		MUNICIPIO	No.
V Nochixtlán	Asunción Nochixtlán		39
V Nochiztian		ndrés Sinaxtla	40
		ian Yucuita	41
		iguel Chicaua	42
		iguel Huautla	43
		edro Coxcaltepec Cántaros	44
		María Apazco	45
		María Chachoapan	46
		go Apoala	47
		go Huauclilla	48
		Domingo Yanhuitlán	49
VI Tootitlón	Mozot	lán Villa de Flores	50
VI Teotitlán			50 51
		ntonio Nanahuatipan ıan de Los Cues	51 52
			52 53
		artín Toxpalan María Ixcatlán	53 54
		María Tecomavaca	55 55
		án de Flores Magón	56
	rediti	an de i lores magon	50
VII Teposcolula	La Trinidad Vista Hermosa		57
	San A	58	
	San B	59	
	San Jı	60	
	San Pe	61	
	Santo	62	
	Teoton	63	
	Villa d	64	
	Villa Tejupan de la Unión		65
PUEBLA			
MUNICIPIO	No.	MUNICIPIO	No.
Ajalpan	1	San Gabriel Chilac	17
Altepexi	2	San José Miahuatlán	18
Atexcal	3	San Miguel Ixitlán	19
Cañada Morelos	4	Santiago Miahuatlán	20
Caltepec	5	Tecamachalco	21
Chapulco	6	Tehuacán	22
Chila	7	Tepanco de López	23
Coxcatlán	8	Tlacotepec de Benito Juárez	24
Coyomeapan	9	Totoltepec de Guerrero	25
Coyotepec	10	Vicente Guerrero	26
Esperanza	11	Xochitlán Todos Santos	27
Ixcaquixtla	12	Yehualtepec	28
Juan N. Méndez	13	Zapotitlán	29
Nicolás Bravo	14	Zinacatepec	30
Palmar de Bravo	15	Zoquitlán	31
San Antonio Cañada	16		

FASCÍCULOS IMPRESOS *

N	o. Fasc.		No. Fasc.
Acanthaceae Thomas F. Daniel	23	Capparaceae Mark F. Newman	51
Achatocarpaceae Rosalinda Medina-	7 0	Caprifoliaceae Jose Ángel Villarreal-	=0
Lemos	73 88	Quintanilla Caricaceae J.A. Lomelí-Sención	58 21
Agavaceae Abisaí García-Mendoza Aizoaceae Rosalinda Medina-Lemos	46	Celastraceae Curtis Clevinger y	21
Amaranthaceae Silvia Zumaya-	40	Jennifer Clevinger	76
Mendoza e Ivonne Sánchez del Pino	133	Chlorophyta Eberto Novelo	94
Anacampserotaceae Gilberto Ocampo-		Cistaceae Graciela Calderón de	
Acosta	84	Rzedowski y Jerzy Rzedowski	6
Anacardiaceae Rosalinda Medina-		Cleomaceae Mark F. Newman	53
Lemos y Rosa María Fonseca	71 31	Commelinaceae David Richard Hunt	y 137
Annonaceae Lawrence M. Kelly Apocynaceae Leonardo O. Alvarado-	31	Silvia Arroyo-Leuenberger Convallariaceae J. Gabriel Sánchez-F	
Cárdenas	38	Convolvulaceae Eleazar Carranza	135
Apodanthaceae Leonardo O. Alvarado-	00	Cucurbitaceae Rafael Lira e Isela	100
Cárdenas	139	Rodríguez Arévalo	22
Araliaceae Rosalinda Medina-Lemos	4	Cyanoprokaryota Eberto Novelo	90
Arecaceae Hermilo J. Quero	7	Cytinaceae Leonardo O. Alvarado-	
Aristolochiaceae Lawrence M. Kelly	29	Cárdenas	56
Asclepiadaceae Verónica Juárez-Jaimes		Dioscoreaceae Oswaldo Téllez V.	9
y Lucio Lozada	37	Ebenaceae Lawrence M. Kelly	34
Asphodelaceae J. Gabriel Sánchez-Ken Asteraceae Tribu Liabeae	79	Elaeocarpaceae Rosalinda Medina- Lemos	16
Rosario Redonda-Martínez	98	Erythroxylaceae Lawrence M. Kelly	33
Asteraceae Tribu Plucheeae	00	Euglenophyta Eberto Novelo	117
Rosalinda Medina-Lemos y José Luis		Euphorbiaceae Tribu Crotonoideae	
Villaseñor-Ríos	78	Martha Martínez-Gordillo, Francisco	
Asteraceae Tribu Senecioneae		Javier Fernández Casas, Jaime Jimé	nez-
Rosario Redonda-Martínez y José Luis		Ramírez, Luis David Ginez-Vázquez,	
Villaseñor-Ríos	89	Karla Vega-Flores	111
Asteraceae Tribu Tageteae José Ángel		Fabaceae Tribu Aeschynomeneae Al	ma
Villarreal-Quintanilla, José Luis Villaseñor-Ríos y Rosalinda Medina-		Rosa Olvera, Susana Gama-López y Alfonso Delgado-Salinas	107
Lemos	62	Fabaceae Tribu Crotalarieae Carmer	
Asteraceae Tribu Vernonieae	02	Soto-Estrada	40
Rosario Redonda-Martínez y José Luis		Fabaceae Tribu Desmodieae Leticia	
Villaseñor-Ríos	72	Torres-Colín y Alfonso Delgado-Salin	as 59
Bacillariophyta Eberto Novelo	102	Fabaceae Tribu Galegeae Rosaura	
Basellaceae Rosalinda Medina-Lemos	35	Grether y Rosalinda Medina-Lemos	121
Betulaceae Salvador Acosta-Castellano	s 54	Fabaceae Tribu Psoraleeae Rosalind	
Bignoniaceae Esteban Martínez y Clara Hilda Ramos	104	Medina-Lemos	13
Bombacaceae Diana Heredia-López	113	Fabaceae Tribu Sophoreae Oswaldo Téllez V. y Mario Sousa S.	2
Boraginaceae Erika M. Lira-Charco y	110	Fagaceae M. Lucía Vázquez-Villagrán	28
Helga Ochoterena	110	Flacourtiaceae Julio Martínez-Ramír	
Bromeliaceae Ana Rosa López-Ferrari		Fouquieriaceae Exequiel Ezcurra y	
y Adolfo Espejo-Serna	122	Rosalinda Medina-Lemos	18
Buddlejaceae Gilberto Ocampo-Acosta	39	Garryaceae Lorena Villanueva-	
Burseraceae Rosalinda Medina-Lemos	66	Almanza	116
Buxaceae Rosalinda Medina-Lemos	74	Gentianaceae José Angel Villarreal-	CO
Cactaceae Salvador Arias-Montes,	•	Quintanilla	60 64
Susana Gama López y Leonardo Ulises Guzmán-Cruz (1a. ed.)	14	Gesneriaceae Angélica Ramírez-Roa Gymnospermae Rosalinda Medina-	04
Cactaceae Salvador Arias-Montes,	17	Lemos y Patricia Dávila A.	12
Susana Gama-López, L. Ulises Guzmán		Hernandiaceae Rosalinda Medina-	
Cruz y Balbina Vázquez-Benítez (2a. ed		Lemos	25
Calochortaceae Abisaí García-Mendoza		Heterokontophyta Eberto Novelo	118
Cannabaceae María Magdalena Ayala	129	Hippocrateaceae Rosalinda Medina-	
* Por orden alfabético de familia		Lemos	115

FASCÍCULOS IMPRESOS *

No. Fasc. No. Fasc. Hyacinthaceae Luis Hernández 15 Plumbaginaceae Silvia Zumaya-Mendoza 85 Hydrangeaceae Emmanuel Pérez-Calix 106 Poaceae subfamilias Arundinoideae, Hypoxidaceae J. Gabriel Sánchez-Ken Bambusoideae, Centothecoideae Patricia Juglandaceae Mauricio Antonio Mora-Dávila A. y J. Gabriel Sánchez-Ken Jarvio 77 Poaceae subfamilia Panicoideae Julianiaceae Rosalinda Medina-Lemos 30 J. Gabriel Sánchez-Ken 81 Krameriaceae Rosalinda Medina-Lemos 49 Poaceae subfamilia Pooideae José Luis Lauraceae Francisco G. Lorea Hernández Vigosa-Mercado 138 82 Polemoniaceae Rosalinda Medina-Lemos y Nelly Jiménez Pérez Lennoaceae Leonardo O. Alvaradoy Valentina Sandoval-Granillo 114 50 Polygonaceae Eloy Solano y Ma. Cárdenas Lentibulariaceae Sergio Zamudio-Ruiz 45 Magdalena Ayala 63 Linaceae Jerzy Rzedowski y Graciela Primulaceae Marcela Martínez-López y 5 Calderón de Rzedowski Lorena Villanueva-Almanza 101 Loasaceae Lorena Villanueva-Almanza 93 Pteridophyta Ramón Riba y Rafael Lira 10 Pteridophyta II Ernesto Velázquez Loganiaceae Leonardo O. Alvarado-52 Cárdenas Montes 67 Loranthaceae Emmanuel Martínez-Ambriz 140 Pteridophyta III Pteridaceae Ernesto Lythraceae Juan J. Lluhí 125 Velázquez Montes 80 Malvaceae Paul A. Fryxell Pteridophyta IV Ernesto Velázquez-Melanthiaceae Dawn Frame, Adolfo Espejo 132 y Ana Rosa López-Ferrari 47 Pteridophyta V Ernesto Velázquez-136 Melastomataceae Carol A. Todzia 8 Montes Meliaceae Ma. Teresa Germán-Ramírez 42 Resedaceae Rosario Redonda-Martínez 123 70 Menispermaceae Pablo Carrillo-Reyes Rhodophyta Eberto Novelo 119 Mimosaceae Tribu Acacieae Lourdes Rico Rosaceae Julio Martínez-Ramírez 120 Arce y Amparo Rodríguez 20 Salicaceae Ma. Magdalena Ayala y Eloy Mimosaceae Tribu Ingeae Gloria 87 Andrade M., Rosaura Grether, Héctor M. Sambucaceae José Ángel Villarreal-Hernández, Rosalinda Medina-Lemos, Quintanilla 61 109 Lourdes Rico Arce y Mario Sousa S. Sapindaceae Jorge Calónico-Soto 86 Mimosaceae Tribu Mimoseae Rosaura Sapotaceae Mark F. Newman 57 Grether, Angélica Martínez-Bernal, Saxifragaceae Emmanuel Pérez-Calix 92 Melissa Luckow y Sergio Zárate 44 Setchellanthaceae Mark F. Newman 55 Molluginaceae Rosalinda Medina-Lemos 36 Simaroubaceae Rosalinda Medina-Lemos Montiaceae Gilberto Ocampo 112 y Fernando Chiang C. 32 Moraceae Nahú González-Castañeda y Smilacaceae Oswaldo Téllez V. 11 Guillermo Ibarra-Manríquez 96 Sterculiaceae Karina Machuca-Machuca 128 Myrtaceae Ma. Magdalena Ayala 134 Talinaceae Gilberto Ocampo-Acosta 103 Nolinaceae Miguel Rivera-Lugo y Eloy Theaceae Rosalinda Medina-Lemos 130 99 Solano Theophrastaceae Oswaldo Téllez V. y Orchidaceae Gerardo Adolfo Salazar-Patricia Dávila A. 17 Chávez, Rolando Jiménez-Machorro y Thymelaeaceae Oswaldo Téllez V. y 100 Luis Martín Sánchez-Saldaña Patricia Dávila A. 24 Orobanchaceae Leonardo O. Alvarado-Tiliaceae Clara Hilda Ramos 127 Cárdenas 65 Turneraceae Leonardo O. Alvarado-Papaveraceae Dafne A. Córdova-Cárdenas 43 Maquela 131 Ulmaceae Ma. Magdalena Ayala 124 Passifloraceae Leonardo O. Alvarado-Urticaceae Victor W. Steinmann 68 48 Verbenaceae Dominica Willmann, Eva-Cárdenas Phyllanthaceae Martha Martinez-Gordillo María Schmidt, Michael Heinrich y Horst y Angélica Cervantes-Maldonado 69 Rimpler 27 Phyllonomaceae Emmanuel Pérez-Calix Viburnaceae José Ángel Villarreal-91 Phytolaccaceae Lorena Villanueva-Quintanilla y Eduardo Estrada-Castillón 97 105 Viscaceae Leonardo O. Alvarado-Almanza Pinaceae Rosa María Fonseca 126 Cárdenas 75 Zygophyllaceae Rosalinda Medina-Plocospermataceae Leonardo O. Alvarado-Cárdenas 108 41 Lemos

^{*} Por orden alfabético de familia

PUBLICACIÓN DIGITAL, NUEVA SERIE *

Libellorum digitalium series nova

144
143
145
142

* Por orden alfabético de familia

ISBN 978-607-30-0903-4 9 7 8 6 0 7 3 0 0 9 0 3 4